

USG klatki piersiowej z oceną płuc – po przechorowaniu SARS-COV-2

W USG klatki piersiowej można obejrzeć powierzchnie płuc oraz wykryć czy wokół płuc nie zbiera się płyn (płyn w jamie opłucnej). Jest to alternatywa dla badania RTG (prześwietlenia), która nie wymaga użycia szkodliwego promieniowania. USG nie pozwala ocenić całej płuc (nie daje możliwości zajrzenia w głąb płuc), ale po zakażeniu SARS-COV-2, większość zmian pozostaje na obwodzie, czyli tam gdzie można je nieinwazyjnie ocenić w USG.

Zalety badania:

- Możliwość obserwowania bardzo niewielkich zmian, które mogą nie być widoczne na zdjęciu RTG
- Możliwość wielokrotnego wykonywania badania w krótkim odstępie czasu.
- Brak promieniowania.

Wskazania do wykonania badania:

- Przebyte zarażenie SARS-COV-2
- Uciążliwy i długotrwały kaszel
- Przewlekłe bóle w klatce piersiowej
- Problemy podczas oddychania

Badanie USG pozwala diagnozować:

- Zmiany resztkowe i przetrwałe po przebytej infekcji SARS-COV-2:
 - Obszary niedodmy
 - Zrosty
 - Zmiany śródmiąższowe położone obwodowe
 - Płyn w jamach opłucnowych